

وأكد أن المسألة لا تخلو من بعض الأخطار الصحية في حال التشخيص الحالي للحالة أو استخدام الدواء الخاطئ أو ظهور أعراض جانبية أو تداخلات دوائية خطيرة مع بعض الأدوية المصروفة لحالات مزمنة بوصفة طبية أو استفحال الحالة المرضية التي استخدمت الدواء بدون وصفة طبية.

وأبان أن الدراسة أجريت على ٢٠٠ طالب وطالبة وكانت الاستجابة للاستبيان بمعدل ٨٥ في المئة، ونسبة الطلاب العرب الذين استجابوا ٩٨ في المئة، وشكلت الطالبات منهم ٩١ في المئة، وكان متوسط أعمار المشاركين في البحث ١٩.٥ سنة. وأقر ٨٦ في المئة من عينة الدراسة استخدامهم للأدوية دون استشارة طبية، وحصل ٧٦ في المئة منهم على الأدوية من الصيدليات باعتبارها مصدراً للأدوية. (١٤)

الفصل الثالث

منهجية البحث

الفصل الثالث

منهجية البحث

نوع الدراسة :

دراسة وصفية Descriptive cross-sectional study

مكان وزمن الدراسة :

تمت الدراسة بولاية نهر النيل بمدينتي بربر وعطبرة خلال شهر مايو ٢٠١٥م.

المستهدفون في الدراسة :

أفراد المجتمع بمدينتي بربر وعطبرة للفئة العمرية ٢٠ سنة فما فوق.

حجم العينة :

تم أخذ عينة عشوائية من بين أفراد مجتمع مدينتي بربر وعطبرة بلغت ١٠٠ فرد ، تم تقسيمها بالتناسب حسب تعداد سكان المدينتين ، إذ تم إستبيان عدد ٢٩ مواطن بمدينة بربر وعدد ٧١ مواطن بمدينة عطبرة.

أماكن جمع العينة :

تم جمع العينة المحددة عشوائياً من مناطق مختلفة ومتفرقة شملت الأسواق ، المنازل ، المراكز الصحية والمستشفيات.

طريقة جمع البيانات :

تم عمل إستبيان (ملحق).

تم توزيع وملء الإستبيان بواسطة الباحثين.

تحليل البيانات :

تم إدخال البيانات في برنامج إكسل ٢٠٠٧ ، وتم تحليل وصفي كامل لمعرفة كل الأهداف المطلوبة.

الفصل الرابع

النتائج

مناقشة النتائج

التوصيات

الخاتمة

الفصل الرابع

النتائج

أ/ نتائج عن أفراد المجتمع في عينة الدراسة:

جدول (١) : نوع أفراد المجتمع في عينة الدراسة:

النوع	العدد	النسبة
ذكر	٤٨	%٤٨
أنثى	٥٢	%٥٢
العدد الكلى	١٠٠	١٠٠ %

جدول (٢) : المجموعات العمرية لأفراد المجتمع في عينة الدراسة:

المجموعة العمرية	العدد	النسبة
٢٠ - ٣٠ سنة	٣٠	%٣٠
٣١ - ٤٠ سنة	٢٣	%٢٣
٤١ - ٥٠ سنة	١٨	%١٨
٥١ - ٦٠ سنة	٢٣	%٢٣
أكثر من ٦٠ سنة	٦	%٦
العدد الكلى	١٠٠	%١٠٠


جدول (٣) : توزيع نوع أفراد المجتمع على الفئات العمرية :

المجموعة العمرية	النوع		العدد الكلي	نسبة الذكور
	أنثى	ذكر		
٢٠ - ٣٠ سنة	١٠	٢٠	٣٠	٣٣%
٣١ - ٤٠ سنة	٩	١٤	٢٣	٣٩%
٤١ - ٥٠ سنة	٨	١٠	١٨	٤٤%
٥١ - ٦٠ سنة	١٦	٧	٢٣	٧٠%
أكثر من ٦٠ سنه	٥	١	٦	٨٣%
العدد الكلي	٤٨	٥٢	١٠٠	٤٨%

ب/ نتائج أهداف البحث الخاصة :

❖ نسبة إنتشار إستخدام عقار المترونيدازول بين أفراد المجتمع:

شكل (١) :المستخدمين لعقار المترونيدازول في عينة الدراسة :



شكل (٢) : نسبة المستخدمين لعقار المترونيدازول بواسطة إستشارة طبية :

