

النتائج : -

منة خلال إجراء الزيارات في مستشفيات مدنية عطبرة في الفترة من مارس حتى يونيو وجدنا أن : —

- ١/ حالات القرحة أكثر انتشارا عند كبار السن .
- ٢/ أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة من شلل (نصفي — كامل) وحالات البتر .
- ٣ / وتحدث عند المصابين بسوء التغذية .
- ٤/ تحدث والإناث والذكور بنسب متبادلة .
- ٥/ وعن عدم الاهتمام .

وفي مستشفى عطبرة التعليمي كان السبب الأساسي عدم الاهتمام بالمريض خلافا في مستشفى السلاح الطبي والشرطة كانت الحالات تأتي من الخارج وذلك لوجود العناية الجيدة بالمريض وفرش .

أما في المستشفى القبطي لا يوجد حالات قرحة فراش لان مده الإقامة قصيرة جدا

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency	النوع
58.8	58.8	58.8	10	meal
100.0	41.2	41.2	7	femal
	100.0	100.0	17	Total

في هذه العينة اتضح إن القرحة تصيب الذكور أكثر من الإناث وذلك بنسبة للرجال ٥٨.٨% والإناث بنسبة ٤١.٢% وذلك عكس ما افترضنا ..

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency	المستشفى
47.1	47.1	47.1	8	السلاح الطبي
64.7	17.6	17.6	3	الشرطة
100.0	35.3	35.3	6	التعليمي عطبرة
	100.0	100.0	17	Total

هذا الجدول يوضح نسبة الإصابات في المستشفيات .

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency	السبب
11.8	11.8	11.8	2	شلل نصفي
17.6	5.9	5.9	1	إستعمال أدوية أعشاب
47.1	29.4	29.4	5	أسباب غير معروفة
88.2	41.2	41.2	7	شلل
94.1	5.9	5.9	1	بتر الرجل
100.0	5.9	5.9	1	عدم العناية
	100.0	100.0	17	Total

اما في هذا التحليل وجدنا إن أكثر الأسباب هي حالات الشلل بنسبة ٨٢.٤% وهي اعلي نسبة إما في حالات البتر اعلي نسبة هي ٥.٩% وهي اقل نسبة ونجد في حالات الشلل النصفي بنسبة ١١.٨% وذلك يوضح إن قرحة الفراش تصيب طريحي الفراش بنسبة عالية .

Cumulative Percent	Valid Percent	Percent	Frequency	العمر
88.2	88.2	88.2	15	<50
11.8	11.8	11.8	2	>50
100.0	100.0	100.0	17	Total

ووجدنا من خلال دراستنا إن قرح الفراش تكون أكثر في الأعمار الأكبر من ٥٠ .

الباب الرابع

الخلاصة : -

تم إجراء الدراسة بمستشفيات مدينة عطبرة ووجدنا الآتي : -

- لوحظ أن المرضى في مستشفيات القوات النظامية (الشرطة - السلاح الطبي) تتوفر لهم عناية فائقة لم توجد بالمستشفيات المدنية والدليل على ذلك لم نجد مريض قرحة الفراش نتيجة بقاءه بالمستشفى بل القادمون من الخارج .

- كما لاحظنا من بداية إجراء البحث في الشهر الأول حتى نهاية الفترة بمعنى في الشهرين الآخرين انحسرت نسبة الإصابة بقرح السرير بالمدينة عامة وهذه دلالة واضحة على ارتفاع مستوى الوعي بالمجتمع

التوصيات : -

١/ نوصي بالعناية بالمرضى طريحي الفراش سوى كانوا منومين بالمستشفيات أو كانوا في منازلهم .

٢/ عدم استعمال المركبات (الكيميائية - العشبية) من غير وصف طبي .

٣/ كما نوصي ببرنامج التغذية السليمة لكبار السن .

٤/ الإكثار من برامج التوعية للمجتمع بكيفية العناية بمواضع الارتكاز بالنسبة للعاجزين عن الحركة (مرضى الغيبوبة أو كل من لهم مرض يجعل بقائهم على الفراش مدة زمنية طويلة) .

المباح الخامس

المراجع

(١) الآية (١٨) سورة الكهف

- 2 . <http://www.surgicalexperts.de/ARABIC%20HOME>
- 3 . <http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=11050>
- 4 . <http://www.toubibonline.com/disabled.asp?subtopicid=288>
- 5 . Fundamental of Nursing .
- 6 . Nursing and medical of fundamental .