بسم الله الرحمن الرحيم





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة التعليم التقني

كليـــة الشيخ عبد الله البدري التقنية

قســم العلوم الادارية وتنمية المجتمع

تم تحميله على الموقع

التخصص تنمية مجتمع

المستوى الثالث

الفصل السادس

بحـــث تكميلـــي لنـــيل الدبـــلوم التقنـــي

بعنوان

المعيـــدز وآثـــاره الاجتماعية

إعداد الطـــالبات :

لنا عبد المنعم إبراهيم محمد

نجلاء عبد المنعم عباس الذاكي

غـــادة مصطفـــي

مـــدينـــة ود رحمـــة

كـــواكـــب الخليفـــة

إشراف الأستـــاذة :-

أمنـة المهـــدي

٢٠٠٩م

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية

قال تعالى:

﴿ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاً ﴾

صدق الله العظيم

١/ سورة الإسراء الاية (٣٢)



الفصل الاول

المقدمة

خطة البحث



الفصل الأول

مقدمة :

الايدز هو محنة هذا العصر ، ولا يوجد له دواء الآن ، الطريقة الأساسية لتجنب الإصابة هو العفة وعدم ممارسة الجنس إلا في إطار الزوجية وكل ما يعطي الأطباء علاجات تقلل مؤقتاً من حدة أعراض الإصابة بالأمراض البكتيرية التي تصيب المريض بضعف المناعة للمصاب بمرض الايدز . ومرض الايدز مرض منقول جنسياً بصورة أساسية ويجب على المرء أن يمتنع عن الاتصالات الجنسية . ينبغي تجنب تعاطي كافة أنواع المخدرات ، ليس فقط تؤدي مشاركة الأيد الملوثة التي بدورها تساعد إلى العدوى بفيروس الايدز .

إن هذا المرض يصيب ثلث الشباب قبل أن يصلوا سن الخامسة والعشرين من العمر.

ويبدأ الشباب مرحلة التحول إلى الرجولة والتي تبدأ عند بعضهم بحرب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر . وتأتي مشاعر القلق بسبب غموض المستقبل وأن موت الشباب يؤدي إلى تدهور الاقتصاد لأنهم يتركون دون عائل مثال ذلك أن ملايين من الأيتام الذين قضى الايدز على أمهاتهم وآبائهم .

ـ أهمية البحث :

تنبع أهمية البحث في خطورة مرض الايدز ووسائل انتشاره وطرق العدوى التي ينتقل بها وعدم التوصل للقاح فعّال يقضي على هذا المرض ويعالجه وكذلك يجب الابتعاد عن الوخز بالإبر والمحاقن التي تستعمل من قبل مريض الإيدز ويجب أن تعقم جيدا ويجب التأكد من نقل الدم الذي ينقل لأي شخص إذا اضطر المريض لنقل دم ويجب أن يتم فحص لدم وثبوت خلوه من فيروس مرض الايدز .أكثر المصابين بهذا المرض هم فئة الشباب وهم الفئة المنتجة والتي يعتمد عليها المجتمع.

مرض الايدز يخلق فئة اجتماعية غير صالحة وينظر إليها المجتمع نظرة دونية مما يؤدي إلي انتشار الأمراض النفسية.

ـ فروض البحث:ـ

١/الانحلال الأسري وضعف الرعاية الأسرية تؤدي إلي انتشار مرض الايدز.

٢/ضعف الوازع الديني يؤدي إلي انتشار مرض الايدز.

٣/سوء استخدام الإبر والمحاقن الصحية بصورة غير صحيحة يؤدي إلي انتشار مرض الايدز.

٤/ارتفاع تكاليف الزواج يقود الشباب إلي الدخول في العلاقات الجنسية الغير مشروعة وذلك يؤدي إلي انتشار مرض الايدز.

٥/إن مشكلة مرض الايدز تسبب تفكك في المجتمع.

ـ أهداف البحث:ـ

-حماية كل قطاعات المجتمع علي أن يكون مجتمع سليم معافي خالي من هذا المرض الفتاك القاتل.

-الدعوة للمعرفة والعفة لان فيهما الحماية المؤكدة من الايدز.

-حث الشباب علي الزواج لأنه الطريق إلي العفاف والحفاظ عليه وإتباع السلوك الديني الحنيف .

-التعرف علي الآثار الاجتماعية لمرض الايدز.

ـ مشكلة البحث:ـ

تتلخص مشكلة البحث في النقاط التالية :-

١/الطريقة الخاصة جدا التي ينتقل عبرها أكثر من ٩٠٪من عدوي المرض والنوع البشري مما يجعل أمر المكافحة صعب وشاق في هذا الجانب.

٢/الايدز بخلاف الأمراض الأخرى يمثل وصمة عار لصاحبه في المجتمع.

٣/مريض الايدز إذا لم يجد الإرشاد الكافي يقود صاحبه لليأس والإحباط وأحيانا إلي الحقد علي المجتمع.

٤/السرعة الكبيرة التي يتزايد بها هذا المرض يؤثر علي البيئة الاجتماعية والاقتصادية وعلي المجتمع.

منهج البحث:ـ

منهج البحث انه منهج وصفي. تحليلي وتاريخي

أدوات جمع البيانات:ـ

-الاستبيان.

-المقابلة.

حدود البحث:ـ

الحدود الزمانية :- الفترة ٢٠٠٨م- ٢٠٠٩م

الحدود المكانية :- ولاية نهر النيل

جامعة الشيخ عبد الله البدري
عمادة المكتبات
مكتبة كلية التكنولوجيا
رقم التسجيل ---------- Regist'n
رقم التصنيف ---------- Classif'n

الفصل الثاني

الاطار النظري

المبحث الأول :

تعريف بمرض الايدز

المبحث الثاني :

كيفية إنتقال المرض

المبحث الثالث :

العوامل الاجنماعية التي تساعد في انتشار المرض

الفصل الثاني
المبحث الأول
تعريف بمرض الأيدز

التعريف اللغوي لمرض الايدز:-

عبارة عن الأحرف الأولي للعبارة الانجليزية التي تمثل الاسم العلمي لهذا المرض هو(AIDZ).

اللفظ باللغة العربية هو تجمع مرض نقص المناعة المكتسبة أي متلازمة النقص أو فقدان المناعة،ويعني ذلك افتقار الجسم إلي نظام مناعي متكامل ضروري لمقاومة ألعدوي المرض ،ونتيجة الإصابة الجسم بالايدز فانه يصبح فريسة سهلة لمخالب ألعدوي الجرثومية عاجز تحت الأورام الخبيثة ولا يستطيع الدفاع علي نفسه أو الخطر بعيدا عن الإمراض التي يترتب عليها إصابة الجسم بمجموعة ضخمة من الأمراض الانتهازية والأورام الخبيثة.

تعريف بمرض الايدز:-

هو فيروس يهاجم خلايا الجهاز المناعي المسئولة عن الدفاع عن الجسم ضد أنواع ألعدوي المختلفة وأنواع معينة من السرطان،وبالتالي يفقد الإنسان قدرته علي مقاومة الجراثيم المعدية والسرطانات،وينتج عن عجز مقدرة أجهزة المناعة في الجسم علي محاربة الكثير من الأمراض وغالبا ما يقود هذا المرض في نهاية المطاف إلي الموت.

وتعني كلمة ايدز متلازمة عوز المناعة المكتسب فيروس يسمي فيروس نقص المناعة البشري وعند الإصابة بهذا الفيروس يكون موجودا في الخلايا الليمفاوية(T)والخلية "ت" وهي خلية مساعدة ولها دور كبير في الجهاز المناعي

للإنسان، يؤدي إلى تدمير خلية" T" أو البكتيريا أو الطفيليات ويصبح الإنسان مريضا.

أن مريض الايدز يكون معرض للأمراض الخبيثة مثل "كبوسي سركوما" والليمفاوية و"التركومار" ويصيب فيروس الايدز الجهاز العصبي وهو فيروس من فصيلة الفيروسات القهرية وهو جرثومة صغيرة جدا لا تستطيع أن تتكاثر أو تعيش إلا داخل خلايا جسم الإنسان، يغلف فيروس الايدز غلاف خارجي يتألف من بروتينات خاصة به وأهمها البروتين الذي بواسطته يتعلق الفيروس بخلية الإنسان ليدخل إليها.

وزارة الصحة–البرنامج القومي لمكافحة الايدز.

تاريخ ظهوره:ـ

أما متى ظهر ؟ ففي عام١٩٨١مسجلت أول الحالات في شاب أصيب بمرض رئوي نادر ثم تلاه أربعة آخرون ووصل العدد الي٢٠٠حالة ثم توالت البلاغات في أنحاء العالم.

يشك العلماء أن دفعة ملوثة من لقاح شلل الأطفال تم إنتاجها باستخدام أنسجة من قرود الشمبانزي تم تعريضها لعدوي شلل هي المسئولة عن تمكن فيروس مرض نقص المناعة المكتسب((الايدن))من تجاوز حاجز الفصائل بين القرود والبشر ،وترجع النظرية السائدة في الأوساط العلمية إلا أن فيروس الايدز تمكن من القفز فوق حاجز الفصائل من الشمبانزي إلي البشر نتيجة لمجموعة من تجارب اللقاحات ،حيث كان احد اللقاحات الذي تم تطويره في أفريقيا في عام١٩٥٧م ملوثا بفيروس الايدز،لكن علماء آخرين لا يرفضون نظرية انتقال الفيروس من القرود إلي البشر بل أنهم لا يعتقدون بأن لقاحاً ملوثا هو الذي كان السبب في هذه النقلة جدير بالذكر إن أكثر من ٦٠مليون شخص مصاب في العالم حتى عام ٢٠٠٣م في أوائل الثمانينات وفي مدينة سان فرانسيسكو لاحظ الأطباء كثرة ظهور ورم جلدي خبيث يدعي مرض كابوسي بين الشواذ جنسياً ومن المعروف أن هذا المرض نادر الحدوث في تلك المناطق،ويظهر مرض كابوسي علي شكل عناقيد متحجرة لونها احمر يميل إلي الزرقة ويصيب الأقدام والأيدي عادة وقد يمتد فيما بعد ليصيب مناطق أخري من الجلد ويتميز ببط الانتشار ويصيب أماكن أخري من الجلد والغشاء المخاطي سرعان ما يهدد حياة المريض ويؤدي إلي وفاته ، وصاحب ظهور تلك الأورام يستعداد لكثرة الإصابة بالأمراض الميكروبية والفطرية والفيروسية والتي كانت أيضا تأخذ شكلاً غير مألوف .

أن كثير من تلك الأمراض تسبب الإصابة بالأمراض ببعض الميكروبات التي لا تصيب الشخص ذا المناعة العادية ويطلق عليها اسم الميكروبات الانتهازية وإنما تصيب من يعانون نقصاً في مناعة الجسم وصاحب ظهور هذه الأورام الجلدية وكثرة الإصابة بالانتهازية الرئوية نقص مطرد في وزن الجسم وتضخم في الغدد الليمفاوية وكان الأمر ينتهي بالوفاة.

المبحث الثاني
كيفية انتقال المرض:-

١/الطريقة الرئيسية للعدوى هي الاتصال الجنسي المباشر الطبيعي أو الشاذ أذا كان احد الطرفين مصاباً،ويمكن أن يحدث بين الشواذ ويشكل ما يقرب من٩٠٪من حالات عدوي الايدز بشخص مصاب وجود أمراض جنسية أخري يضاعف احتمالات ألعدوى.

٢/استخدام الإبر وأدوات ثقب الجلد الملوثة بالفيروس مثل أدوات ثقب الأذن وأدوات الحلاقة والحجامة والوشم الغير معقمة وفرشاة الأسنان التي يستخدمها المصابون خاصة أذا كانت هنالك جروح أو تقرحات علي الأغشية المخاطية أو الجلد ،كما سجلت بعض الحالات نتيجة عدم تعقيم أدوات معالجة الأسنان ومشكلة إدمان المخدرات شديدة الصلة بانتشار الايدز عن طريق الحقن الوريدية وعموماً تشكل ألعدوي بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن نسبة ٢-٥٪من الحالات.

٣/من الأم المصابة إلي جنينها أثناء فترة الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية ويتراوح خطر احتمال انتقال الفيروس من الأم الحامل بالفيروس إلي وليدها ٢٢-٥٠٪ إذا لم يتم إعطائها العلاج.

٤/زراعة الأعضاء مثل الكلية ،القلب ،من متبرع مصاب.

٥/نقل الدم أو منتجاته الملوثة بالفيروس ،في البلدان التي لم تهتم بفحص الدم .

٦/تعرض الخدوش أو الجروح أو الدم والسوائل الملوثة.

حالات علاج مرض الايدز:-

لا يوجد علاج ضد الايدز، لكن الأدوية المتوفرة رغم ارتفاع أثمانها فهي تثبط نشاط الفيروس وتؤخر سير المرض وتخفف المعاناة منه فقط، إما نسبة اللقاح لا توجد، ولم يتمكن الباحثون والعلماء حتى الآن من تطوير لقاح فعّال ضد مرض الايدز أما الحل فهنالك طرق بسيطة وفعالة للوقاية من المرض تعتبر أكثر أهمية من أي لقاح يمكن اكتشافه وتتمثل هذه الطرائق بالتمسك بالقيم الأخلاقية ،والاجتماعية والدينية التي تحظر السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر وتحصر الممارسة الجنسية في أطار العلاقات الزوجية الشرعية التي أباحتها الشرائع السماوية والأعراف الاجتماعية.[1]

---

[1] - وزارة الصحة-البرنامج القومي لمكافحة الايدز

أما نسبةً لانتقال الفيروس من الأم الحامل لجنينها :-

*يحدث أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة.

*نسبة الانتقال حوالي ٢٥-٤٠٪في الدول النامية وحوالي ١٥-٢٥٪في البلدان المتقدمة(عادات الرضاعة).

*يزداد معدل الانتقال بزيادة كمية الفيروس كما هو الحالة في بداية الإصابة والحالات المتأخرة.

*احتمال الإصابة أثناء الرضاعة يصل إلي ١٥٪في بعض البلدان النامية.

الطرق التي لا ينتقل بواسطتها الايدز: -من حسن الحظ أن مرض الايدز لا ينتقل ألا من سلوكيات معينة يمكن التحكم فيها،فهو لا ينتقل عن طريق إلاّ عن طريق الوسائط التالية :-

١/المخالطة العارضة أو الاتصالات الشخصية في محيط الأسرة أو المشاركة في أماكن العمل أو المدرسة أو قاعات الدراسة كالمصافحة والمعانقة.

٢/المشاركة في المأكل والمشرب أو وسائل المواصلات أو وسائل المواصلات العامة أو المسابح أو دورات المياه أو من خلال حنفيات شرب المياه أو استخدام أجهزة الهاتف أو عن طريق الملابس أو العطس والسعال بواسطة الحشرات كالذباب والبعوض.

مراحل الإصابة بفيروس الايدز وأعراض كل مرحلة:ـ

المرحلة الأولي:ـ

المرض الحاد بعد فترة ٣ايام إلي أسابيع لوجود الفيروس في الجسم.

أعراض هذه المرحلة:ـ

١/حمي.

٢/تضخم العقد الليمفاوية الرقبية.

٣/التهاب البلعوم والحنجرة.

٤/الآم عضلية وصراع شديد.

٥/بقع علي الجزع ومصاحبة بألم في الحلق.

وتبقي هذه الإعراض لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم تختفي ويكون الفحص ألمخبري لاكتشاف الأجسام المضادة سلبياً إذا إن تحول المصل إلي ظهور الأجسام المضادة للفيروس في الدم يحدث بمدة ألعدوي بشهر أو ثلاثة شهور وتعرف هذه الفترة بالفترة النافذة.ويسمي الشخص المصاب بحامل الفيروس HIV إذ لم تظهر عليه أعراض المرض،ولكن يكون مصدراً قويا للعدوى ونقل المرض.

المرحلة الثانية:ـ

وتعرف بدور الكمون وتمتد من ٦شهور إلي سنوات عديدة ويتكاثر خلال هذه الفترة الفيروس ويصيب المزيد من الخلايا الليمفاوية التالية"T٤"مناعة الشخص المصاب تدريجياً.

عادة لا تظهر أعراض مرضية في هذه المرحلة ويعرف الشخص أيضا حامل الفيروس،وتعتبر المرحلتان الأولي والثانية كفترة حضانة للمرض التي تسبق الإصابة

بالمرحلة الثالثة التي تعد مرحلة ظهور المرض بأعراضه النهائية ويعتبر المصاب بمرض الايدز.

المرحلة الثالثة:-

تعرف بمرض الايدز وتتراوح هذه الفترة بين سنة وسنتين وتنتهي بالوفاة في حالة كان المصاب لا يتبع العلاج وتوجد أعراض سريريه واضحة هي:-

١/حمي.

٢/نقص الوزن والتعرق الليلي.

٣/السل وانتفاخ الغدد الليمفاوية.

٤/أمراض السرطان وخاصة سرطان الجلد الكابوسي.

٥/اعتلال الجهاز العصبي نتيجة ما يسببه التهاب الدماغ والسحائي .

٦/إسهالات مدمنة.

٧/تقرحات في الفم والحلق حادة وتساهم العوامل الوراثية والبيلوجية والفيروسية وكيفية التقاط المرض والظروف المحيطة بالوصول إلي هذه المرحلة النهائية من المرض.[١]

[١] -وزارة الصحة-البرنامج القومي لمكافحة الايدز.(الانترنت).

المبحث الثالث
العوامل الاجتماعية التي تساعد في انتشار الايدز

*عدم الاستقرار في منطقة شرق ووسط أفريقيا.

*الحركة السكانية الواسعة للمواطنين داخل السودان بسبب :-

أ/الحرب.

ب/الكوارث الطبيعية.

ج/عوامل اقتصادية.

د/الهجرة للعمل أو الدراسة بالخارج.

ه/السلوك الجنسي الغير منضبط خارج الأطر الشرعية أو مع شركاء متعددين ،يمكن معرفة مريض الايدز بمظهره الخارجي ،لا يمكن معرفة المريض إلا بالتحاليل المخبرية واختبارات الايدز وبعض الأعراض المتلازمة فقط تؤكد ألعدوي ويبدو في كامل صحته.

ـ أثره علي الأسرة والمجتمع:ـ

الوصمة الاجتماعية والتمييز:-

هي شكل من أشكال التحامل أو النزعة ضد شخص أو مجموعة علي أساس الاختلاف المتصور وتنشأ الوصمة الاجتماعية المتعلقة بفيروس الايدز في اغلب الحالات الخوف من المرض والجهل به وتتخذ عدة أشكال بينما الامتناع عن مشاركة في تناول الطعام ،وسوء معاملته بدنياً ونفسياً بما في ذلك نشر الشائعات المشينة عنه والنميمة فيه ،ويواجه العمل وعندما لا يشاركونه في تناول الطعام.

يمكن تعريف التميز:-

بأنه أي فعل أو إجراء يؤدي إلي معاملة غير عادلة بسبب شخصاً ما ينتمي ويعتقد إلي مجموعة معينة ،فالتمييز المتصل بالفيروس معادلته غير عادلة للناس علي أساس إصابتهم فعلاً أو ظناً بفيروس الايدز وهذه الأمثلة لبعض الحالات الأكثر شيوعاً ولكنه اخطر من الوصمة الاجتماعية والتمييز بين المصابين والمؤثرة فيه.

ـ التوظيف:ـ

من بين الأمثلة لممارسات التمييز أن يطلب من المتقدم لوظيفة إجراء الفحص اللازم لفيروس مرض الايدز قبل التعيين ويثبت الفحص إصابة من التوظيف والتعرض للمضايقة في مكان العمل والضغط عليه بالمستقبل.

ـ السكن:ـ

ومن الأمثلة علي التمييز رفض الملاك إيجار عقاراتهم من غير إبداء الأسباب ومضايقة المستأجرين المصابين بفيروس مرض الايدز ومطالبتهم بالإخلاء دون أسباب معلنة.

ـ التعليم:ـ

يمكن أن يتعرض المعلمون المصابون بفيروس مرض الايدز للمضايقة أو سوء المعاملة أو الفصل استناداً علي الخوف الغير منطقي من انتقال الفيروس إلي الأطفال ،والانتقال الواسع للتخوف والجهل بفيروس مرض الايدز أدي إلي أن يتخذ أكثر من الكبار إجراءات متطرفة لمنع الأطفال المصابين من الاستمرار في الدراسة بالمدرسة أو سحب أطفالهم من المدرسة خوفاً من الاختلاط بالأطفال المصابين بفيروس مرض الايدز.

ـ أثره علي الفرد:ـ

*الفرد :ـ

قد يمارس الأفراد الأصحاء التميز ضد الأفراد الآخرين المصابين بهذا المرض وبخاصة في حالات الأسر الممتدة((من غير أقرباء الدرجة الأولي))الذين يعيشون سوياً،ويرجع ذلك الخوف من أن يمارس المجتمع التمييز ضد الأسرة.

*الخدمات :ـ

قد يمارس مقدمو الخدمات التمييز وخاصة في الرعاية الصحية ،ومن الأمثلة علي ذلك رفض الأطباء والممرضين معالجة المرضي المصابين أو المشكوك في إصابتهم بفيروس مرض الايدز والتمييز في تقديم خدمات أو تعمد التقديم لمستوي ضعيف من الرعاية الصحية أو اتخاذ إجراءات تحوطيه لا مبرر لها لتفادي الإصابة.

ـ هنالك بعض العوامل الاجتماعية التي تساعد في انتشار الايدز:ـ

قضايا النوع البشري التي تساهم في انتشار الايدز:ـ

ـ النساء معرضات لخطر اعلي للإصابة مقارنة بالرجال بسبب عوامل ثقافية واجتماعية حيوية واقتصادية.

ـ تعتبر الشريك عموما أكثر بين الرجال مقارنة بالنساء حسب التقارير.

ـ هجرة الرجال للعمل تؤدي إلي هدم الروابط الزوجية.

ـ بعض الفتيات يسلكن سلوك خطر للحصول علي دخل من اجل البقاء.

القضايا الثقافية التي تتعلق بالاشتراك في مكافحة الايدز:ـ

ـ تبقي الأغلبية الواسعة من الشباب بموضوع الجنس والأمراض المنقولة جنسياً.

ـ الكثير منهم لا يعتقدون بأنهم في خطر.

ـ قلة الخدمات الصديقة للشباب مثل معالجة الأمراض المنقولة جنسياً.

ـ قلة الخدمات والإرشاد النفسي والفحص الطوعي السري.

ـ قلة التفاوض في استخدام الواقيات الجنسية.

- قلة الدعم الصحيح من الآباء والمجتمع والحكومة.
- الأوهام حول الايدز مثل عضة البعوض والسحر تنقل الايدز.
- معظم الشباب يحصلون علي المعلومات حول الجنس من أصدقائهم او الأفلام الإباحية.
- العديد من الشباب لا يذهبون للعناية الطبية لأنهم يخافون من عدم احترام أسرهم.

لا يجب عزل مريض الايدز بالمستشفي إلا إذا دعت حالته الصحية لذلك . إن المرض لا ينتقل بالمخالطة العارضة بالمنزل أو العمل ،ويتعامل المجتمع مع مريض الايدز ،أن مريض الايدز هو إنسان يحتاج إلي العطف والرعاية ،لذلك خطره علي المجتمع يمكن السيطرة عليه من خلال تجنب السلوكيات التي تساعد علي انتقال ألعدوي خاصة الاتصال الجنسي أو استخدام أدوات مشتركة من المواد الثاقبة للجلد مثل الإبر والمحاقن عملية دون الحاجة إلي عزله عن المجتمع أو الحجز علي تحركاته مادام هو حريصاً علي عدم نقل ألعدوي إلي غيره.

ـ طرق الوقاية:ـ

- التعفف والامتناع عن أي علاقة جنسية خارج العلاقة المشروعة.
- تشجيع الفحص الطوعي قبل الزواج.
- الامتناع عن جميع المخدرات وخصوصاً الحقن.
- استعمال المحاقن ذات الاستخدام الواحد،وعدم تبادل استخدام الأدوات الحادة أو أي أدوات تسبب خدوش أو جروح كأمواس الحلاقة،وفرش الأسنان.
- التأكد من سلامة الدم المنقول.

- تجنب ألام المصابة الحمل حفاظاً علي حالتها الصحية من التدهور وحماية الجنين من الإصابة بالعدوى.
- عدم التعرض للدم الملوث أو مشتقاته.
- عدم استخدام محقن مشترك لحقن المخدرات في الوريد أو تحت الجلد مثل((الهيروين–الكوكايين)).
- متابعة الذين يجري لهم نقل دم من المتبرعين.
- الأشخاص المصابين بمرض الهموفيليا يجب عليهم معالجة عبوات الدم ومشتقاته بالتسخين إلي درجة ٦٠مئوية لمدة ساعة للقضاء علي فيروس الايدز.
- عدم القيام بالعلاقات الجنسية خارج إطار الحياة الزوجية.
- القيام بالتأكد من عينات الدم المنقولة.
- التأكد من تعقيم الأدوات الطبية بالطريقة الصحيحة والآمنة.
- الابتعاد عن المخدرات والسلوك الجنسي غير السليم.
- عدم التعرض للجروح والسوائل الملوثة بالدم.
- يجب إزالة جميع المحاولات عن جاهلية الغرب التي تدعو إلي التحرر الجنسي والإباحية والشذوذ الجنسي والانحطاط الأخلاقي.
- التمسك بالدين الحنيف والتوعية اللازمة للآباء والأمهات لتقديم الرعاية الصحية.
- العلاج الكامل تحت إشراف الطبيب.
- التخلص من التغير في المجتمع العربي.
- دور المؤسسات والصحف والمجلات والمواقع الإسلامية لرد الاستنكار للفعل المشين.

- الإخلاص لشريك واحد غير مصاب.
- عدم الإباحية الفاضحة في الشذوذ الجنسي.

الفصل الثالث

الدراسة الميدانية
الخاتمة
النتائج والتوصيات

الفصل الثالث

الدراسة الميدانية ـ تحليل البيانات

تحليل الاستبيان للوصول إلى النتائج لمرض الإيدز :

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الآثار الاجتماعية لمرض الايدز وقد تم جمع المعلومات عن طريق الاستبيان – واستهدفت الدراسة العاملين في وزارة الصحة ولاية نهر النيل – وبلغت عينة الدراسة (٢٠)من مختلف العاملين بالوزارة (أطباء وموظفين)

جدول رقم (١) يوضح أكثر فئة مصابة بالمرض :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
فئة الشباب	٢٠	١٠٠٪
فئة المراهقين	–	–
فئة كبار السن	–	–
المجموع	٢٠	١٠٠٪

نلاحظ من الجدول أعلاه من أكثر الفئات التي يصيبها مرض الايدز هم فئة الشباب بلغت نسبتهم ١٠٠٪ .

جدول رقم(٢) يوضح التعامل مع مريض الإيدز :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
العطف والرعاية	٢	١٠٪
معاملة طبيعية	١٨	٩٠٪
معاملة قاسية	–	–
المجموع	٢٠	١٠٠٪

نجد أن ٩٠٪ من المبحوثين يروا ان مريض الايدز يجب يعامل معاملة طبيعية و١٠٪ فقط منهم الذين يرون أن معاملة مريض الايدز يجب أن تكون معاملة مصحوبة بالعطف والرعاية .

جدول رقم (٣) أهم أعراض المرض :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
فقدان الشهية	٢	٪١٠
ارتفاع درجة الحرارة	٨	٪٤٠
ضعف الصحة	١٠	٪٥٠
المجموع	٢٠	٪١٠٠

نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسبة ٥٠٪ من اعراض المرض تتمثل في ضعف الصحة وهي أكبر نسبة . .

جدول رقم (٤) يوضح انتشار مرض الإيدز ينتج عن :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
الانحلال الأسري	٨	٪٤٠
ضعف الرقابة الأسرية	١٢	٪٦٠
المجموع	٢٠	٪١٠٠

نلاحظ من الجدول اعلاه من العوامل الأكثر المساعدة على انتشار المرض تتمثـل في ضعف الرقابة الأسرية بنسبة ٦٠٪ .

جدول رقم (٥) يوضح الاتصال الجنسي المباشر بسبب حالة عدوى بنسبة :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
٪٧٠	–	–
٪٨٠	٣	٪١٥
٪٩٠	١٧	٪٨٥
المجموع	٢٠	٪١٠٠

يرى المبحوثين ان الايدز ينتقل بنسبة ٩٠٪ عن طريق الاتصال الجنسي وقد بلغـت نسبة ٨٥٪.

جدول رقم (٦) يوضح الدخول في العلاقات الجنسية الغير مشروعة سببها:

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
ارتفاع تكاليف الزواج	٢	٪١٠
تعاطي المخدرات	–	–
ضعف الوازع الديني	١٨	٪٩٠
المجموع	٢٠	٪١٠٠

يرى المبحوثين أن العلاقات الغير مشروعة سببها ضعف الوازع الديني وقد بلغت نسبتة ذلك ٩٠٪

جدول رقم (٧) يوضح فيروس مرض الإيدز يهاجم :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
الجهاز التناسلي	٢	٪١٠
الجهاز الحركي	–	–
الجهاز المناعي	١٨	٪٩٠
المجموع	٢٠	٪١٠٠

يرى المبحوثين أن فيروز الايدز يهاجم الجهاز المناعي بنسبة ٩٠٪ و١٠٪ فقط منهم الذين يروا هذا المرض يصيب الجهاز المناعي .

جدول رقم (٨) يوضح كيفية التعامل مع المرضى المصابين بحالات الإيدز :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
البعد عن الاتصال الجنسي غير الشرعي	١١	٪٥٥
استخدام العازل	٧	٪٣٥
الامتناع عن المخدرات خصوصاً بالحقن	–	–
مكاشفة الشريك الجنسي	٢	٪١٠
المجموع	٢٠	٪١٠٠

يرى أن ٥٥٪ من المبحوثين يجب الابتعاد عن الاتصال الجنسي الغير شرعي مع مريض الايدز و٣٥٪ يروا أنه يجب استخدام العازل و١٠٪ يروا أن يجب مكاشفة الشريك .

جدول رقم(٩)يوضح هل أن نسبة المصابين في المجتمع في تزايد أم في تناقص :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
متزايدة	١٧	٨٥٪
متناقصة	٣	١٥٪
المجموع	٢٠	١٠٠٪

يرى المبحوثين ان نسبة المصابين في المجتمع متزايدة وقد بلغت نسبتهم ٨٥٪ و١٥٪ منهم يروا أن نسبة المصابين بالايدز في تناقص .

جدول رقم (١٠)يوضح آثار المرض اجتماعيا :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
على المجتمع	٦	٣٠٪
الوصمة الاجتماعية	١٠	٥٠٪
تفكك المجتمع	٤	٢٠٪
المجموع	٢٠	١٠٠٪

يرى المبحوثين أن أكبر نسبة توضح آثار المرض اجتماعية وهي الوصمة الاجتماعية نسبتهم ٥٠٪ و٢٠٪ منهم يرون أنه يؤدي إلى تفكك المجتمع .

جدول رقم (١١) يوضح السلوكيات الاجتماعية التي تؤثر على المجتمع :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
سلبياً	١٣	٦٥٪
إيجابياً	٧	٣٥٪
المجموع	٢٠	١٠٠٪

يرى المبحوثين أن المجتمع تسيطر عليه العديد من السلوكيات السلبية حيث بلغت نسبتهم ٦٥٪ و٣٥٪ يرون أنه تسيطر عليه عدد من السلوكيات الايجابية .

جدول رقم (١٢)يوضح الممارسة الجنسية الغير شرعية في المجتمع وتعتبر :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
سلوك خاطئ	١٥	٧٥٪
سلوك شاذ	٥	٢٥٪
المجموع	٢٠	١٠٠٪

٧٥٪ من المبحوثين يروا الممارسة الجنسية الغير شرعية اعتبر سلوك خاطئ و٢٥٪ يرون أنها سلوك شاذ .

جدول رقم (١٣)يوضح المجتمع اهتمام المجتمع بالأفراد ويضم المصابين بالمرض:

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
يهتم	١١	٥٥٪
لا يهتم	٩	٤٥٪
المجموع	٢٠	١٠٠٪

نجد ان ٥٥٪ من المبحوثين يرون أن المجتمع يهتم بأفراده خاصة المصابين بالايدز و٤٥٪ يرون انهم لا يهتم بأفراده .

جدول رقم (١٤)يوضح أن مرض الايدز قاتل لا شفاء منه ولا يوجد له علاج :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
علاج شافي	–	–
لقاح	٦	٣٠٪
الأدوية العلاجية	١٤	٧٠٪
المجموع	٢٠	١٠٠٪

يرى المبحوثين ان مرض الايدز لايوجد له علاج شافي و٧٠٪ من المبحوثين يرون أنه يعالج عن طريق بعض الأدوية .

جدول رقم (١٥)يوضح أن مرض الإيدز يخلف فئة اجتماعية منبوذة من المجتمع :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
نظرة دونية	٢	٪١٠
منبوذة	١٤	٪٧٠
غير مقبولة	٤	٪٢٠
المجموع	٢٠	٪١٠٠

يرى معظم المبحوثين أم مرض الايـدز يخلـق فئـة منبـوذة في المجتمـع قـد بلغـت نسبتهم ٧٠٪ .

جدول رقم (١٦)يوضح التعامل مع مريض الإيدز في استعمال الأدوات الشخصية :

الإجابة	الفئة المبحوثة	النسبة
الإبر والحاقن	١٢	٪٦٠
استعمال الفرشاة	٨	٪٤٠
تبادل الملابس	–	–
المجموع	٢٠	٪١٠٠

يرى المبحوثين أن أكثر طرق نقل المرض في إسـتعمال الأدويـة هـو الإبـر والمحـاقن وبلغت نسبتهم ٦٠٪ و١٠٪ فقط يروا استخدام الفرشاة تؤثر في انتقال المرض .

الخاتمة :

الإيدز مرض منقول جنسياً بصورة أساسية ويجب على المرء أن يمتنع عن الاتصال الجنسي الغير مشروع ، وأتضح من خلال الدراسة التي أجريت على عينات من المجتمع أن هذا المرض يصيب ثلثي الشباب وذلك في الفئة العمرية من سن الخامسة والعشرين.

ويؤدي إلى تدهور اقتصادي وذلك بسبب تركهم دون عائل لأن الملايين من الأيتام الذين قضى الإيدز على أمهاتهم وآبائهم .

ويجب على الأسرة أن تهتم بأفرادها وتعمل بقدر الإمكان من حمايتهم من المغريات وما ينشره الغرب في وسائل إعلامه من أفلام وبرامج تؤدي إلى انحراف الشباب وتؤثر في سلوكياتهم .

وكذلك يجب على المقبلين على الزواج أن يبادروا في إجراء الكشف الطبي وذلك للوقاية قدر الإمكان من المرض والمساعدة على الحد من انتشاره .



ـ النتائج:ـ

١/عدم التوعية الكافية بهذا المرض تؤدي إلي ممارسة الوصمة الاجتماعية والتمييز تجاه المصابين.

٢/هنالك تجاهل سلبي تجاه المصابين بمرض الايدز من قبل المجتمع في دور الرعاية الصحية.

٣/الوصمة والتمييز المرتبطة بمرض الايدز تؤدي إلي التخوف من التوجه إلي مراكز الفحص الطوعي.

٤/التعامل مع مريض الايدز بصورة طبيعية قد تؤدي بالشخص المصاب إلي الانعزال والاكتئاب والتفكير في الانتحار.

٥/الوصمة الاجتماعية قد ترفع المصاب إلي عدم الإفصاح عن مرضه وبالتالي عدم الذهاب لدور الرعاية الصحية مما يقلل من مكافحة مرض الايدز.

ـ التوصيات:ـ

١/ضرورة العمل علي التقليل من آثار الوصمة والتمييز الاجتماعية .

٢/ضرورة تعبئة وتحريك المجتمع وتعريفه بالمرض.

٣/تضمين المقررات والمناهج الدراسية.

٤/تحصين ورعاية ومساندة المصابين داخل البرامج الاجتماعية الموجودة فعلاً.

٥/تشجيع التوجه التطوعي والفحص الاختباري.

٦/تسهيل الوصول وكل العناية والمساندة الطبية.

٧/تكثيف الأنشطة وتعلية صوت جمعيات المتعايشين مع المرض في الحديث عن الايدز حتى يمكن التعامل مع مريض الايدز بشكل أنساني.

ـ المصادر:ـ

- ❖ وزارة الصحة البرنامج القومي لمكافحة الايدز .
- ❖ جمعية تنظيم الأسرة .
- ❖ برنامج مكافحة الإيدز .
- ❖ مواقع الانترنت
- ❖ كتاب الصف الثالث الثانوي

محتويات البحث

الموضـــــــوع	الصفحة
الآية	أ
إهداء	ب
الشكر والتقدير	ج
الفصل الأول	
المقدمة	١
خطة البحث	٢ – ٤
الفصل الثاني	
المبحث الأول : الإطار النظري	٥ – ٨
المبحث الثاني : كيفية انتقال المرض	٩ – ١٣
المبحث الثالث : العوامل الاجتماعية التي تساعد في انتشار الإيدز	١٤ – ١٩
الفصل الثالث	
الدراسة الميدانية – تحليل البيانات	٢٠ – ٢٥
الخاتمة	٢٦
النتائج والتوصيات	٢٧ – ٢٨
المصادر والمراجع	٢٩
فهرس الموضوعات	٣٠

استبيان عن مرض الايدز

البيانات الأولية :

١/ دراسة حالة مرض الايدز

النوع ☐ العمر ☐ الحالة الاجتماعية ☐ السكن ☐

٢/ أكثر فئة مصابة بمرض الايدز

فئة الشباب ☐ فئة المراهقين ☐ فئة كبار السن ☐

٣/ كيف يمكن التعامل مع مريض الايدز

العطف والرعاية ☐ معاملة طيبة ☐ معاملة قاسية ☐

٤/ كيف تعرف أعراض المرض

فقدان الشهية ☐ ارتفاع درجة الحرارة ☐ ضعف الصحة ☐

٥/ انتشار مرض الايدز ينتج عن

الانحلال الأسري ☐ ضعف الرقابة الأسرية ☐

٦/ الاتصال الجنسي المباشر يسبب حالات عدوى الايدز بنسبة

٧٠٪ ☐ ٨٠٪ ☐ ٩٠٪ ☐

٧/ الدخول في العلاقات الجنسية غير المشروعة سببها

ارتفاع تكاليف الزواج ☐ تعاطي المخدرات ☐ ضعف الوازع الديني ☐

كثرة اختلاط الشباب ☐ ما تبثه وسائل الإعلام من أفلام خليعة ☐

٨/ فيروس مرض الايدز يهاجم

الجهاز التناسلي ☐ الجهاز الحركي ☐ الجهاز المناعي ☐

٩/ كيف يتم التعامل مع المرضى المصابين لحالات الايدز

البعد عن الاتصال الجنسي غير الشرعي ☐ استخدام العازل ☐

الامتناع عن المخدرات خصوصاً بالحقن ☐ مكاشفة الشريك الجنسي ☐

١٠/ هل نسبة المصابين في المجتمع بمرض الايدز بمعدلات متزايدة أم متناقصة

نسبة متزايدة ☐ متناقصة ☐

١١/ يسبب مرض الايدز آثار اجتماعية

الحقد على المجتمع ☐ الوصمة الاجتماعية ☐ تفكك المجتمع ☐

١٢/ المجتمع تسيطر عليه السلوكيات الاجتماعية

سلبياً ☐ إيجابياً ☐

١٣/ الممارسة الجنسية في المجتمع تعبر عن

سلوك الشاذ ☐ سلوك خاطئ ☐

١٤/ المجتمع يهتم بالأفراد ويهتم بالمصابين بمرض الايدز

يهتم ☐ لا يهتم ☐

١٥/ أضرار مرض الايدز قاتل لا شفاء منه يوجد له علاج

علاج شافي ☐ لقاح ☐ الأدوية العلاجية ☐

١٦/ مرض الايدز يخلق فتنة اجتماعية

ينظر المجتمع نظرة دونية ☐ منبوذة ☐ غير مقبولة ☐

١٧/ تمثل أضرار في المعاملات المنزلية

الإبر والمحاقن ☐ استعمال الفرشاة ☐ تبادل الملابس ☐